

TRIMEX - noćno sagorijevanje kalorija

TEKUĆI PRIPRAVAK ZA REDUKCIJU VIŠKA TJELESNE MASTI:

- kompleks aminokiselina
- hca - ekstrakt biljke garcinia cambogia
- antioksidanse iz iscrpine zelenog čaja
- ulje žutoga noćurka (izvor linolenske kiseline)
- ulje sjemenki g rejpa
- minerali - vanadij, krom i mangan.

U ČEMU JE TAJNA DJELOVANJA TRIMEX-A?

Tajna uspješnosti, svakako nije u samo jednom sastojku već u pravilno postavljenoj kombinaciji sastojaka. No, ipak zvijezda **Trimexa je hidroksicitrat (HC)**, djelatna tvar iz biljke Garcinia cambogia. Sažeci najnovijih istraživanja o djelovanju HC -a:



HC/HIDROKSICITRAT - ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA:

- HIDROKSICITRAT SMANJUJE SINTEZU MASNIH KISELINA IZ GLUKOZE U ADIPOZKOM (rezervnom) MASNOM TKIVU
- HC INHIBIRA ENZIM ATP- CITRAT LIJAZU, SMANJUJUĆI SINTEZU MASNIH KISELINA IZ GLUKOZE ZA 88%, IZ PIRU VATA ZA 70%
- HC SMANJUJE UNOS HRANE I APETIT TE POVEĆAVA KOLIČINU GLIKOGENA U JETRI (MOBILIZACIJA MASNIH KISELINA IZ ADIPOZNOG TKIVA).
Jednom kada je blokirana pretvorba UH u masti, što se tada dešava sa preostalim UH iz obroka? Tijelo se riješava preostalih UH tako da ih sagorijeva u toplinu. Rezerve glikogena su popunjene, sinteza masti blokirana, krajnja poruka tijelu je da treba prestati jesti - smanjuje se apetit.
- DOTOK L-KARNITINA DO MASTI SE POVEĆAVA KORIŠTENJEM HIDROKSICITRATA.

Ostali sastojci, djelovanje:

Krom je vrlo značajan mineral koji putem Faktora tolerancije glukoze sudjeluje u regulaciji šećera u krvi. Odlika je krom pikolinata da vrlo brzo uvodi red u naš apetit i «uči» nas da jedemo samo tada kada smo zaista gladni.

Vanadij je mineral koji ima sposobnost oponašati inzulin, te povećava osjetljivost stanica za inzulin, čime on biva bolje iskorišten. Vanadij se preporučuje oboljelima od dijabetesa 1 i 2. Prema nekim studijama vanadij može imati ulogu u sniženju kolesterola i krvnoga tlaka. Poznato je da narodi koji žive na onim područjima Zemlje bogatim vanadijem imaju daleko manju stopu obolijevanja od srčanih bolesti. Upravo vanadij u i kromu možemo zahvaliti na tome da upotrebom Trimexa prestaje potreba za neprestanim i čestim grickanjem između obroka, što je jedan od glavnih razloga za debljanje.

UZ TRIMEX SE MNOGO LAKŠE GUBI REZERVNA TJELESNA MAST, REGULIRA APETIT, TE JAČA FUNKCIJA JETRE I POSPJEŠUJE NJEZINO ČIŠĆENJE.

UPOTREBA: uzima se 1-2 jušne žlice tri sata nakon zadnjeg obroka.

**Informacije, učlanjenje i narudžbe na br. mob.
091/47-44-777, Mihael Kovačević
www.calivita-hr.com**